



درخت انار: برنامه ریزی ساحه باغ میوه

۱. انتخاب نوع (ورایتی) و پایه مادری

نوع و پایه مادری درخت انار را به اساس معیارهای ذیل انتخاب نمایید:

- مناسب بودن ساحه رشد
- تقاضای مبتنی بر مارکیت
- قابلیت و ظرفیت محل بسته بندی

۲. انتخاب محل

محل را با در نظر داشت شرایط ذیل انتخاب نمایید:

- آب وافر (از طریق باران یا آبیاری)
- درجه حرارت بیشتر از ۵- الی ۱۵- در زمستان. توجه: هرگاه قبل از یا در هنگام شگوفه درختان در فصل بهار سرمای بی موقع صورت گیرد، تمام محصولات



ورایتی را
انتخاب نمایید
که دارای
نموی خوب
بوده و تقاضا
برای آن
وجود داشته
باشد

- میتواند نابود گردد.
- خاک های عمیق و خطر سرمای بی موقع را
- از غرس نهال انار پشته ها و نباتات
- از استواری، پایین نگهداشتن خاک کشت ننمایید.
- غرس با کشت نبات

۳. آماده سازی خاک

خاک را قبل از کشت نبات قلبه نموده یا آنرا با بیل شخم بزنید. مواد عضوی (بطور مثال؛ کود حیوانی یا نباتی خوب تخمیر شده) را مخلوط نموده و به ضخامت ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر در سطح خاک قبل از کشت نبات استعمال نمایید، این کار باعث نفوذ جریان هوا به داخل خاک گردیده و سبب آزاد شدن مواد مغذی میگردد. در صورتیکه درجه pH خاک پایین تر از ۷ باشد، میتوانید در هر ۹ متر مربع زمین به میزان ۵. ۴ کیلوگرام چونه علاوه نمایید. نایتروجن غیر عضوی را در هر هکتار زمین نایتروجن خالص به میزان ۲۰ الی ۵۵ کیلوگرام استعمال نمایید.


۴. خشاوه

قبل از کشت نبات تمام گیاهان هرزه را از بین ببرید.

۵. طرح یا دیزان کشت درخت

گرده افشانی خودی: نبات انجیر را در بلاک های یکپارچه و لاینقطع طوری بنشانید که فاصله بین قطار ها ۵ تا ۷ متر و فاصله بین درختان در یک قطار ۳ تا ۵ متر باشد. برای اشکال بته بی، و یا در جاهای که انتظار می رود میزان محصولات بالا باشد (مثلاً؛ خاک های غنی با آب و مواد غذایی کافی) فاصله بین نباتات میتواند کم باشد.

ورایتی های دارای گرده افشانی غیر خودی: درختان گرده افشان را، در صورتیکه در حد مطلوب میوه تولید نمایند، به تعداد مساوی با درختانی که توسط آنها گرده افشانی میگردند، کاشت نمایید. هرگاه میوه درخت گرده افشان از کیفیت مناسب برخوردار نبود، ۱ درخت گرده افشان را در میان ۸ درخت اصلی تولید کننده میوه غرس نمایید (شکل پهلویی را مشاهده نمایید) موثرترین دیزاین برای غرس درخت گرده افشان اینست که در هر سه متر مربع، ۹ درخت تولید کننده اصلی میوه غرس شده و در بین آنها یک درخت گرده افشان کشت گردد؛ یعنی بعد از هر سه قطار و بعد از هر سه درخت.



تهیه شده توسط: لوییس فرگوسن، کارکی لوبین، جان درایور، مارک ای بیل، و پاول مارکوت

جهت معلومات مزید، از برنامه های جهانی در نشانی: www.ip.ucdavis.edu بازدید بعمل آورید.