

C برخه: د حیواناتو یا څارویو د مناسبې خوراکی اړتیاوي

شیرم لوست: د غذا یا خوراکی برابرول

اصطلاح گاني

- Dry matter intake د وچو موادو اخستل
- Dry period د وچولو وخت او زمان
- Growth نمو
- Overfeeding . زياد تغذيه كول
- Underfeeding كمه تغذيه كول

د حیوان سټاک د تغذي سټراتیژي څه ده؟

- په ټول وخت کې لومړی له شیدو څخه د بچی جلا کول ډیر مهم دي نسبت دي ته چې د شیدو قیمت لوړ شي او دانه باب د لوړ کیفیت لرونکي وي. خوسکي ډیر پاملرنې ته اړتیا لري
- ددې لپاره چې یو خوسکی خپل لوړ ظرفیت ته ورسیري نو باید چې هغه په ښه توګه تغذیه کړل شي.
- تنظیم او اداره کولی شي چې د حیوان د هرې ورځې د نمو اندازه تعیین کړی .

د حیوان سټاک د تغذي سټراتیژي څه ده؟

- A . د نمو انکشاف

- Growth یا نمو : د بدن د حیاتي برخو د زیاتوالی نه عبارت ده لکه غړي، هډوکي او د لری انکشاف یا نمو. ورو نمو د حیوان په وروستی عمر کي جبران کیدلی نه شي او د ټول ژوند لپاره یو منفي اثر دی.
- د نمو انکشاف د جسامت د اندازې په اساس او د بدن شکل په اساس بنودل کیږي.

د حیوان سټاک د تغذي سټراتیژي څه ده؟

B . Condition growth د نمو کولو شرایط .

- د دې لپاره چې یو حیوان له لنگون نه وروسته د تولید یوي بني سطحې ته ورسیري دا ضرور او اړینه ده چې هغې حیوان ته په کافي اندازې سره عوض کونکی ورکول شي.
- شرطیه نمو د شحم د اندازې پوري تړلی ده کوم چې د حیوان په بدن کي زیرمه شوي دي او د نمر وړکولو په اساس له بدن سره اندازه کیري.

د حوان سټاک د تغذي سټراټیژي څه ده؟

- نیمگري خوراکه او منجمنت په لومړی کال کې له دي نه وروسته چې خوسکی له شیدو نه بیل کړل شي د دي سبب کيږي چې د هغې نمو وروسته پاتي شي په دوهم کال کې د بیا حل لپاره هغه درملنه کيږي ولي د هغې توليدي قدرت کميږي.

د حوان سټاک د تغذي سټراټیژي څه ده؟

- د بچی زیرولو فاصله یو کال ده په دي اساس سره په لومړیو دریو میاشتو د تولد کي غوا د شیدو ورکولو لوړ حد ته رسیږي.
- له ۹۰ ورځو څخه وروسته غوا باید حامله یا بلاربه شي او خپل د شیدو تولید تر لسمي میاشتي پوري د بچی د تولد پوري دوام ورکړي دوه وروستی میاشتي له هغې وخت نه عبارت دي چي غواگانو باید وچي شي (شیدی تري وانه خستل شي) د شیدو ورکولو په لومړی مرحله کي د انرژي منفي بیلانس د بچی د زیریدني د فاصلي سبب کیږي (او د شیدو وخت) چي په کمی اندازې سره دوام وکړي.
- د تغذي نقطي نظره د شیدو ورکولو دوران په دریمه مرحله کي سقوط کوي.

د غواگانو د تغذي ستراتيژي کومي دي؟

- Dry period د وچوالی وخت

- وچوالی وخت: له هغه وخت نه عبارت دی چې په هغې کې غوا شیدې نه تولیدوي.

- سره له دې چې غواګانې شیدې نه تولیدوي مګر حیوان د بچې تولیدیدني په وخت کې په ښه حالت کې وي. چې دا د شیدو ورکولو په وخت کې د لوړ تولید تضمین وي.

- داسې سپارښتنه کېږي چې خوراکه یا غذا دي (پرتله له دانه بابو) له وچیدو نه یوه ورځ تر دمخه محدوده شي چې دا کار د شیدو د تولید او د Mastitis د خطر د کموالی سبب کېږي.

د غواگانو د تغذي ستر اثيري کومي دي؟

- دا وخت غوا ته اجازه ورکوي چي خپل مخکني شيدي ورکول ترميم Recover کړي او حيوان د راتلونکي کال لپاره په کافي اندازي سره خپل غړي ترميم کړي. د بچي زيريدني څخه مخکي وخت کي د تغذي سطحه اړيکه نيسي په اندازي د:
- د شيدو توليد وخت پوري تړلي يو ځايي تغذيه: د بچي ورکولو په وخت کي به د غوا حالت ښه وي. يوه حامله يا بلاربه غوا د شيدو ورکولو په وخت کي خراب حالت ولري د وچيدلو په وخت کي هغه د ښي خوراكي جوړولو لپاره اړتيا لري.
- د وچيدلو د وخت اوږدوالي: د بچي زيرولو څخه دوه مياشتي مخکي سپارښتنه کيږي. د وچيدلو زيات وخت د حيوان په راتلونکي توليد باندي منفي اثر کوي.
- د بچي زيريدني څخه مخکي د غوا او خوسکي لپاره غوښتنه: د حاملگي يا بلاربوالي په دوه اخري مياشتو کي رحم او خوسکي په چټکي سره انکشاف کوي د حيوان د تغذي اړتيا د حيوان د حالت پوري تړل کيږي.

د غواگانو د تغذي ستر اثيري کومي دي؟

- **Overfeeding** له اندازې څخه زياته خوراکه: د حاملگي يا بلاربوالی په اخره مياشت کي په اصطلاح چي د مصرف وخت دی. د حيوان توليدي ظرفيت اجرات د حيوان صحت او حاصل ورکول په لومړی شيدی ورکولو کي ټول د هغي د شيدو په عمومي توليد باندي اثر لري. عاقلانه کار دا دی چي غذايي مواد يعنی دانه باب د غوا د وچولو په وخت کي وساتل شي (ورنه کرل شي)
- **Under feeding** له اندازې څخه کمه خوراکه ورکول: د وچيدو په وخت کي د راتلونکی کال لپاره د شيدو توليد د نيمگړتيا سبب کيږي. چي دا کار د شيدو ورکولو په وخت کي د جبران او اصلاح وړ نه دی. له حد څخه کم تغذيه کول يا کمه بيلانس شوي تغذيه د نسکليری تشکيل نا منظم کوي او د حيوان په صحت باندي اثر لري.

د غواگانو د تغذي لپاره اوه اساسات کوم دي؟

● Early lactation وختي شيدې ورکول

- د شيدو د توليد نمونه د خوسکي د شيدو د اړتيا له نموني سره تړاو لري .
- د ځنيو بيولوژيکي دليلونو په نسبت د يوه حيوان فزيولوژيکي رفتار د شيدو توليد لپاره په خاص توگه د لومړي شيدو ورکولو له وخت پوري تړلی دی. په دي وخت کي تغذيه کول ډير مهم دی .
- په بچي زيروني څخه مخکي او وروسته تغذيه کول د شيدو په اعظمي حاصل باندې تاثر لري. په شيدو ورکولو کي د شيدو د حاصل اصلاح متناسبه ده د غذايي مواد تغذيه کول د شيدو ورکولو په وخت کي.

د غواگانو د تغذي لپاره اوه اساسات کوم دي؟

- DMI (Dry matter intake) له لنگوان څخه لږ څه د مخه يا هم له لنگوال نه په سمدستي توگه وروسته د وچو موادو اخستل لږ کميري چي بنايي ۴۵-۵۰ له DMI پوري مربوط نارمل وي. له لنگوال څخه وروسته اشتها په تدريجي توگه ښه کيري. له ۱۰-۱۲ هفتي له لنگوال څخه وروسته خپل کامل يا بشپړ حالت ته رسيري.
- د دانه بابو او تازه غذايي موادو عوض کول کوم چي ښه کيفيت ولري د شيدو ورکولو په وخت کي د شيدو په توليد باندې ښه تاثير لري.
- که چيري يوه غوا د شيدو په لومړي توليد کي په وزن اخستلو او ښه حالت باندې پيل وکړي د دي معنی دا ده چي ذکر شوي غوا خپل د توليد ظرفيت ښکاره کوي.

د غواگانو د تغذي لپاره اوه اساسات کوم دي؟

- د شيدو ورکولو د لومړی دوران حني مهمي کتنې شاملې دي په
- اعظمی حاصل: د توليد ممکنه سطحه د اعظمي حاصل په اساس په نظر کي نيول کيږي چي دا ترلي دي په .
- د يوه حيوان ظرفيت
- د لنگوال يا بچی زيږونې په وخت کي د بدن حالت
- د لومړنی شيدو ورکولو په دوران کي د تغذي سطحه

د غواگانو د تغذي لپاره اوه اساسات کوم دي؟

- د شيدو ورکولو د دوران د حاصل وړاندوينه: د شيدو ورکولو نمونه بيلگه په لومړي شيدو ورکولو کي اساس کښيودل کيږي. د شيدو حاصل په پنځمه مياشت کي خپل اعظمي حد ته رسيږي او يا هم ۳-۴ لومړيو اونيو کي او وروسته په ورو توگه کموالي پيدا کوي .
- حاصل ورکولو حالت : هر کله چي د وزن اخستلو او حاصل ورکولو حالت کموالي پيدا کوي کله چي د بدن د درجه بندي حالت له منځني حد نه ښکته کيږي نو په پير کم شمير سره غواگاني به غويمه شي او د القاح اندازه يي ۵۰ فيصدو وزن اخستل په غويمه توب او القاح باندي مثبت تاثير لري.

د غواگانو د تغذي لپاره اوه اساسات کوم دي؟

- mid and late lactation : ناوخته او منځنی شیدې ورکول
- په منځنیو شیدو ورکولو کې ۱۲-۲۰ اونۍ وروسته له لنگوال څخه د شیدو د تولید لپاره غذايي موادو ته اړتیا کمه ده. په نتیجه کې اضافي غذايي مواد یوه برخه په اضافي شیدو بدل او بله برخه یې د بدن وزن ترمیم لپاره په کار وړل کېږي.

د غواگانو د تغذي لپاره اوه اساسات کوم دي؟

- په هيڅ علت سره تغذيه کول د توليد د اړتياوو په اساس نه محاسبه کيږي.
- د شيدو ورکولو په پای کي بايد چي د عوضي تغذي کيفيت او اندازه د بيا حل لپاره عياره شي همدارنگه پرمختللي توليدي سيستمونه حيوان ته اجازه ورکوي ترڅو چي د بيا حل لپاره د بدن وزن حاصل کړي ترڅو يي د بدن حالت د قبول وړ اندازي ته ورسيږي.

بیا کتته / خلاصه یا لنډیز:

- د حوان ستاک د تغذي لپاره د موخو یا هدفونو تشخیص.
- د غواگانو د تغذي لپاره د موخو یا هدفونو تشخیص