

(E) برخه: د مغز لرونکو او غیر مغزي میوو تولید

شپږم لوست: د انارو تولید (Production of Pomegranate)

د زده کونکو د زده کړې موخې یا هدفونه: زده کونکي به ددې لوست په پایله کې د لاندې موخو یا هدفونو سره اشنا شي، ددې لوست تشریحات به د لاندې موخو یا هدفونو د لاسته راوړنې سبب شي:

1. د انارو (Punica granatum) د تاریخچې په برخه کې بحث وکړئ.
2. هغه شرایط تر بحث لاندې ونیسئ چې د انارو د رشد او نمو لپاره مناسب او وړ وي.
3. د انارو د حاصل اخستلو د وخت په برخه کې څېړنه او نظر وړاندې کړئ.
4. د افغانستان د انارو عامې نوعې تشخیص او تعین کړئ.

د لوست د تدریس لپاره وړاندیز شوي وخت: ۲ ساعته

وړاندیز شوي منابع یا زیرمي: لاندې منابع یا زیرمي کیدلی شي چې په دې لوست کې کټوري واقع شي. د درسي پلان د غوره مخکې وړلو لپاره نوموړي پلان په پاورپوینټ کې هم تهیه شوي دي. انټرنیټ د باغونو د حشراتو د کنټرول په برخه کې کافي معلومات لري. په دې برخه کې لاندې ځنې منابع ذکر شوي دي:

- <http://www.crfg.org/pubs/ff/pomegranate.html>
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Pomegranate>

د سامانونو، وسایلو، لوازمو او اساسنتیاوو فهرست یا لیک لړ

د لیکلو لپاره سپینه یا تشه ورقه یا صفحه
د پاورپوینټ لپاره پراجکتور(غټ بڼودونکی)
د پاورپوینټ سلايدونه یا صفحي
روښانه سلايدونه
د انار نموني یا بیلگي
د تکثیر د تمرین یا مشق لپاره د انار نبات

اصطلاح گاني: لاندې اصطلاح گاني په دې لوست کې وړاندې کيږي. (نوموړي اصطلاح گاني د

پاورپوینټ پروگرام په ۲ شمیره سلايد کې بڼودل شوي دي):
Aril آريل یا د تخم(د میوې د دانې)ضمیمه يي پوښښ یا داخلي کیسه چې د میوې د اوبو(juice) پواسطه ډکه شوي وي او د سپین نما لرونکی مغز(pulp) پواسطه احاطه شوي وي

په زړه پوري تگلاره: له يوې په زړه پوري تگلارې څخه گڼه پورته تکرر ترڅو چې زده کونکي د لوست د زده کړې لپاره آماده کړي. ښوونکی اکثره د خپلو ځانگړو ټولگيو لپاره د زده کونکو د شرايطو سره سم تگلاري تهيه او برابروي يا ترتيبوي. لاندې تگلاره کيدلی شي چې د يوې ممکنه تگلارې په ډول سره ورڅخه يادونه وکړل شي: له زده کونکو څخه پوښتنه وکړي چې آیا هغوي کله هم د انار ميوه خوړلی ده، هغوي بايد چې ددې په ځواب کې خپل لاسونه په چوپټيا سره پورته کړي. له هغوي نه پوښتنه وکړئ چې انار څنگه معلومېږي او د هغې خوند او ذائقه څنگه وي. کونښن دي وکړل شي ترڅو چې د انار مختلفې نمونې يا بيلگي کومې چې په افغانستان کې شتون لري د زده کونکو لپاره تهيه او برابري کړی شي، په هغه صورت کې چې نمونې يا بيلگي شتون ونه لري پس له تصويرونو يا انځورونو څخه استفاده وکړئ. او د همدې بحث نه په استفادې سره د لوست لومړۍ موخې يا هدف ته داخل شئ!

د محتوا يا منح پانگو لنډيز او درسي ستراتيژي گاني

لومړۍ موخه يا هدف: د انارو (Punica granatum) د تاريخچې په برخه کې بحث وکړئ.

(د پاورپواینټ ۲ شميره سلايد)

۱. انار چې لاتيني يا علمي نوم يې Punica granatum دی د نړۍ له عالي يا لوړو ميوو څخه شميرل کيږي.

A. انارو د افغانستان له اطرافو او په شمالي هندوستان کې د هماليا له غرونو څخه سرچينه اخستی ده.

1. انار د مديترانې (Mediterranean) په ټوله سيمه کې له پخوانيو زمانو څخه اهلي او محلي شوي دي.

2. انار په ټول سراسر هند کې او د جنوبي آسيا په وچو برخو، ماليا، ختيځ هند او د افريقا په وچو منطقو (tropical) کې کښت او شنه کيږي.

(د پاورپواینټ ۴ شميره سلايد)

4. د انار د کښت او کرنې لپاره تجارتي اساسي منطقي په نړۍ کې منځنی ختيځ، هندوستان او د هغې چاپيره هيوادونه او هم جنوبي اروپا څخه عبارت دي.

5. د انار ميوه پرته له څيرنې او مطالعې څخه خوړل کيږي.

a. د انار ميوه (Pomegranate) ډيري د جوس په شکل سره په مصرف رسيږي او د هغې جوس په څو طريقو سره جوړيدلی شي.

a. د انار جوس په تازه شکل، شربت، جيلي او ساس (bug) شکلونو سره خوړل کيدلی شي.

b. د انار تجارتي شربت د grenadine په نامه سره پلورل کيږي.

د زده کونکو لپاره يوه نقشه برابره کړئ او له هغوي نه غوښتنه وکړئ ترڅو چي هغه منطقي په نښه کړي چي په هغو کي انار رشد او نمو کوي. په هغه صورت کي چي امکان شتون ولري د زده کونکو لپاره د انار نموني يا بيلگي او يا هم د انار توليدات وښايست.

دوهمه موخه يا هدف : هغه شرايط تر بحث لاندې ونيسئ چي د انارو د رشد او نمو لپاره مناسب او وړ وي.

(د پاورپوائنټ ۵ شميره سلايد)

ii. انار په نيمه وچ اقليم کي او همدارنگه په معتدله حرارت درجه او نيمه حاره منطوقو (subtropical) کي رشد او نښه نمو کوي او په طبيعي توگه په هغو منطوقو کي چي د يخ ژمې او گرم اوږي لرونکي وي خپل ځان عادت کولى شي.

A. مرطوب اقليم يا هم نمناکه اقليم د انار په ميوه باندې په منفي توگه تاثير لري.

1. په هغه صورت کي چي د حرارت يا تودوخې درجه له منفي يولسو څخه ښکته

شي د انار ميوه په جدي توگه صدمه گوري.

2. د انار ونه په کانتينر او ځني وختونه په گلخانو کي په ميوې ورکولو باندې پيل

کوي.

(د پاورپوائنټ ۶ شميره سلايد)

A. د انار ونه د گلبې بوټې ته ورته شکل يا هم گرد د وږي ونې شکل لري چي له ۶ نه تر ۹

متره پوري رشد او نمو کوي، ولي په عامه توگه د انار ونې اوږدوالى له ۳،۵ نه تر ۴،۸ متره

پوري وي.

1. د انار ونه د لنډ قد لرونکو نوعو په نامه سره هم شهرت لري.

2. د انار نبات يو پاڼې غورځونکى ونه ده، ولي په ځنيو ساحو کي خپل پاڼي ساتلى

شي.

3. د ونې تنه (trunk) د سور خرمايي پوستکى پواسطه پوښل شوى ده چي

وروسته يي رنگ خاکستري کيږي.

a. د انار د ونې ښاخونه سخت، هډوکين او معمولاً د اغزو (spiny) پواسطه

پوښن شوي دي.

b. د انار ونه په قوي توگه ميلان لري ترڅو چي لاندنيو ښاخونو sucker ته له

بيخ يا قاعدې څخه رشد او نمو ورکړي.

نوټ: لاندني ښاخ يا sucker له هغې ښاخ نه عبارت دی چي د ونې له بيخ يا قاعدې څخه راټوکيږي او د هغې د قوت سبب کيږي.

(د پاورپوائنټ ۷ شميره سلايد)

د پاور پوائنټ دا شميره سلايد د يوه رسيدلی يا بالغ (mature) انار ونه په گوته کوي. خو ښاخونو (multiple branches) ته اشاره کوي چي تقريباً ۲۰ سانتي متره د ونې له تنې نه پورته يي رشد کړی دی. سره له دي چي دا موضوع به د ښاخ پري کولو د عنوان لاندې تر بحث لاندې ونيول شي.

(د پاورپوائنټ ۸ شميره سلايد)

4. د انار ونه هم د اورده عمر لرونکو ونو له جملې څخه گڼل کيږي. په اروپا کي د انار داسې نموني يا بيلگي شتون لري چي له ۲۰۰ کالو څخه زيات عمر لري.
5. د انار د ونې شينوالی او ځوانې تقريباً وروسته له پنځلس کلونو څخه کميږي او د هغې درشد او نمو قوت کميږي.

1. انار هغه نبات دی چي خپله په خپله گرده شيندونکی (self-pollinated) دی ولي د حشراتو پواسطه هم غير خودي گرده شيندل (cross-pollinated) يي سرته رسيدلی شي.

- a. غير خودي د گردې شيندل (cross-pollinated) د ميوې اندازې ته زياتوالی ورکوي.
- b. د باد پواسطه د گردې شيندل بي معني او کم اهميته دي.

(د پاورپوائنټ ۹ شميره سلايد)

- A. انار تقريباً گرده يا مدوره قيافه يا شکل لري او له ۶ نه تر ۱۲ سانتي مترو پوري عريض وي او په خپله نوکه کي د کالیکس پواسطه تاج لرونکی يا کاکلي شوي دی.
- کالیکس له هغې کاسې نه عبارت دی چي کاسبرگونه په هغې باندې ځای لري
1. د انار پوستکی سخت او څرمنې ته ورته دی چي معمولاً د هغې رنگ گلابي او تند سور وي.
 2. د انار د ننی برخي د غشايي ديوالونو پواسطه چي څو ورو برخو يا قطعاتو (compartments) باندې جلا شوي دي او دا کيسې د جوسي پلپ pulp يا اريل aril پواسطه په سور گلابي سپين رنگه نما سره بسته بندي شوي دي .

a. د هري کيسې يا چانټې (sac) په منځ کې يوه نرمه دانه يا سخته تيره دانه شتون لري.

(د پاورپواینټ ۱۰ شمیره سلايد)

د پاورپواینټ دا شمیره سلايد يوه انار په ونه کې او يا هم يو نيم شوي انار په گوته کوي. تاسې کونښن وکړئ ترڅو حقيقي انار زده کونکو ته وښايست او د هغوي په مخ کې انار قطع او د انار داخلي برخې په عملي توگه تر مطالعې يا څيړنې لاندې ونيسئ. هو! گرانو زده کونکو د انار داخلي ساختمان او د هغې داخلي ظرافت هغه درس دی چې انسان د هغې له خالق سره وصلوي.

(د پاورپواینټ ۱۱ شمیره سلايد)

1. د دې لپاره چې د انار مزه او خوند په لوړه کيفيت سره په لاس راشي پس د ميوې ورکولو په وخت کې د هغې لپاره د حرارت لوړه درجه لازمي او ضروري ده.
 - a. د انار ونه ښايي چې له خښولو نه يو کال وروسته په ميوه ورکولو پيل وکړي ولي له دوه نيمو نه تر درې کالو پوري وخت يې د ميوې ورکولو لپاره ډير عام دی.
 - b. د مساعدو شرايطو لاندې د انار ميوه له غوټې کولو نه وروسته د ۵ نه تر ۷ مياشتو مودې پوري پخيري (mature).

(د پاورپواینټ ۱۲ شمیره سلايد)

- A. د دې لپاره چې د لور کيفيت لرونکي انار ميوې په لاس راشي نو بايد چې د انار ونې ترټولو په گرمو او لمر لرونکو سيمو د حويليو يا باغونو کې ځای ولري، اگر چې د هغې گل ورکول او رشد تر يوې اندازې پوري په سوپري کې صورت به ونيسي.
 1. انار په عادي خاوره کې او ښه نم ويستل شوي خاوره (well-drained) کې لوړه نتيجه يا پايله لري، همدارنگه په چونه لرونکي خاوره يا لوم تيزابي خاوره او يا هم په جغل لرونکو خاورو کې ښه نتيجه يا پايله ورکوي.
 2. له دې څخه وروسته چې د انار ونې ښه ځای او استقرار ونيوه پس د وچکالۍ په مقابل کې د ملاحظې وړ تاب پيدا کوي، ولي بيا هم د ښې ميوې دلاسته راوړنې لپاره د انار ونه بايد اوبه کړل شي.
 - a. د دې په خاطر چې نوي کړل شوي نباتات ښه ځای په ځای شي بايد په وچ فصل (dry season) کې په هرو دوو نه تر څلورو اونيو پوري يو ځلی اوبه کړل شي.
 - b. د انار نبات د مالگينو اوبو په مقابل کې او هم د مالگينو خاورو په مقابل کې په نسبي توگه منځنی حد د تحمل کولو لري.

(د پاورپوائنټ ۱۲ شمیره سلايد)

1. د انار د هرې يوې ونې لپاره په دوه لومړنيو پسرليو کې د ۵۶ نه تر ۱۱۳ گرامو پورې د نايټروجن سره يا کود ورکول کيږي، ولې ددې لپاره چې د هغې د تغذوي موادو لپاره اړتياوي معلومې شوي وي بايد چې خاوره ټيسټ (test) کړل شي يا هم د هغې لابراتواري ازموينه تر سره شي.

a. دا چې نباتات ورسټي شوي حيواني سري يا کود او د کلني ملچ (annual mulch) کولو نورو کمپوسټونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي ولې له دوه کلونو څخه وروسته په کمې اندازې سره سري يا کود ورکولو ته اړتيا ليدل کيږي.

(د پاورپوائنټ ۱۴ شمیره سلايد)

1. د انار نبات بايد هغه وخت چې ۶۰ سانتي مترو ته ورسيري د بيا ځل لپاره پري يا قطع کړل شي.

a. له همدې نقطې څخه څلور يا پنځه ځوانې ساقې (shoot) پريږدي ترڅو چې رشد او انکشاف وکړي، ددې لپاره چې ونه په متوازنه توگه ښه وي پس همدا څلور يا پنځې ځوانې ساقې په مساويانه توگه د ونې په تنه کې تقسيمې کړئ.

b. نلغه يا ځوانې ساقې له ځمکې څخه د ۳۰ سانتي مترو په اندازې سره پريږدئ اگر چې لنډه ده ولې د ونې تنه واضح او معلومه به وي.

c. هره جوانه او لاندنۍ ښاخ (sucker) چې په پورتنۍ برخه يا هم د ځوانو ساقو په ښکتنیو برخو کې انتخاب شوي وي ښکاره کيږي چې بايد پري او لري کړل شي.

(د پاورپوائنټ ۱۵ شمیره سلايد)

d. له هغه ځايه چې د انار ميوه د ونې په راس يا څوکه کې باداره کيږي، نو په دې بنا داسې سپارښتنه کيږي چې د درې لومړنيو کلونو لپاره ښاخونه په اختياط سره لنډ کړل شي ترڅو چې د نويو ساقو اعظمي حد په ټولو سمتونو کې تشويق کړل شي او له نامنظم رشد او نمو څخه مخنيوي وشي او يو قوي نبات په لاس راوړل شي.

e. له دريم کال څخه وروسته يوازې لاندنۍ ښاخ يا بن ښاخ (هغه ښاخونه چې د ونې له بيخ نه راټوکيږي او د هغې قوت نيسي) او له منځه تللي ښاخونه له منځه يوسي يا پي لري کړئ.

(د پاورپوائنټ ۱۶ شمیره سلايد)

1. د انار ونه له تخم (seed) څخه پالل كيدلى شي ولي بنايي چي د والدينو عين ځانگړتياوو ته تبارز ورنه كړي.
- a. د انار د ونې قلمي په آسانۍ سره ريښي وباسي او تقريباً له كال نه وروسته په ميوه وركولو باندې راځي.
- b. په ژمې كې هغه قلمي چي له ۳۰ نه تر ۵۰ سانتي مترو پوري اوږدوالى ولري له كامل نبات يو كلن بناخ څخه واخستل شي.
- c. د قلمي پاڼې لري كړئ او قلمي د ريښو ويستونكو پارونكو يا تحريكونكو موادو (rooting hormone) پواسطه معامله كړئ او تقريباً دوه پر دري برخي د قلمي په خاوره كې او يا هم په بله ريښه ويستونكى وسيله (rooting medium) كې داخل كړئ.
- d. د انار نبات هوايي ويده (air-layered) كيدلى هم شي ولي قلمه كول په كمه توگه كيامياب كيدلى شي.

(د پاورپوائنټ ۱۷ شميره سلايد)

1. په اكثرې توگه انار نسبتاً د ناروغيو او آفاتو په وړاندې بي غمه وي.
 - a. د پاڼې داغ او د ميوې داغ هغه مشكلات دي چي په انار كې شتون لري پاڼې صدمه د سپنو مچانو (white flies) پواسطه، پريپسونو (هغه حشره چي د گياوو شيره څښي) او لاک توليدونكو scale insects حشراتو يا پواسطه (د هغو حشراتو نوعي چي د هغې بنځينه جنس فلس ډوله ترشح كوي او د هغې لاندې هگۍ اچوي) منځته راځي.
- له زده كونكو څخه غوښتنه وكړئ ترڅو چي انار د قلمي په شكل سره تكثير كړي. په هغه صورت كې چي د انار ونه شتون ولري هغه د زده كونكو لپاره ويناياست. او يا هم دا كيدلى شي چي يو نفر د انارو كروندگر خپل ټولگي ته دعوت كړئ او هغه د زده كونكو لپاره د انارو د تنظيمي او اداري په برخه كې خبري اتري وكړي.

درېمه موخه يا هدف: د انارو د حاصل اخستلو د وخت په برخه کې څېړنه او نظر وړاندې کړئ.

(د پاورپوائنټ ۱۸ شمېره سلايد)

۱۱۱. د انار ميوه هغه وخت پخه گڼل کېږي چې برجسته رنگ ته انکشاف ورکړي او هر وخت چې ووهل شي (ورو ضربه) فلزي اواز ورکړي.

A. د انار ميوه مخکې له دې چې ډيره زيات پوخوالی (over maturity) ته ورسېږي، مخکې له دې نه چې په انار کې درزونه رامنځته شي بايد وشو کول شي.

1. د انار ميوه هم لکه د منې په شان په انبار کولو او زيرمه کولو کې اورد عمر لري.
2. انار د حرارت د صفر نه تر ۵ درجو د سانتې گريد کې ډير بڼه ساتل کېدلی شي او د اوه مياشتو لپاره په يخو خونو کې په همدې درجه کې چې نسبي رطوبت له ۸۰ نه تر ۸۵ فيصدو پورې وي پرته له دې چې انار وروست شي او يا هم خپلې اوبه له لاسه ورکړي، ساتل کېدلی شي
3. د انار ميوه په زيرمه ځايونو کې غوره کېږي، د هغې جوس زيات خوندور او مزه يې اضافه کېږي.

له زده کونکو څخه پوښتنه وکړئ چې د انارو د مصرفولو او پېرودلو په وخت کې د هغې کوم ظاهري خواص يا ځانگړتياوې په نظر کې نيول کېږي (زده کونکي بايد چې د دې خصوصياتو لست برابر کړي) له دې نه وروسته دې دا خصوصيات يا ځانگړتياوې په فلپ چارټ کې درج کړي او هغه دې په ټولگي کې څوړند کړي. زده کونکي بايد چې په دې برخه کې بحث وکړي چې ولې دا ځانگړتياوې د غوښتل شويو انارو لپاره درج شوي دي؟

څلورمه موخه يا هدف: د افغانستان د انارو عامي نوعي تشخيص او تعين کړئ.

(د پاورپوائنټ ۱۹ شمېره سلايد)

۱۷. په افغانستان د انارو زياتي محلي يا بومي نوعي شتون لري.

A. **سورکندهاري انار (Sor Kandahari)** د کندهار په ولايت او هغې په شاوخوا سيمو کې پيدا کېږي.

1. کندهاري سور انار گرد او رنگ د هغې سور وي ذايقه او خوند يې ترش وي.
2. يوه دانه کندهاري سور انار تقريباً ۲۳۳ گرامه وزن لري.

B. **د کاپيسا ميخوش انار**

1. ميخوش انار خرمايي رنگ او غټ دايروي شکل لري، په دې معنی سره چې په خپلو غاړو کې راوتلي برخي او څنډي لري.

2. منځنۍ ذایقه او خوند لري يعني د ترش او خور په منځ کي متوازن حالت د ځان لپاره يي نيولی دی او دهغې منځنۍ وزن د هریوه انار لپاره ۱۸۹ ګرامه دی.

(د پاورپواینټ ۲۰ شمیره سلايد)

- D. **تاشقرانی انار** په بلخ او ننگرهار ولایتونو کي پیدا کيږي.
1. تاشقرانی انار گرد شکل او خرمايي او سره رنگونه لري.
 2. ذایقه او خوند د دي انار ترش دی او تقریباً منځنۍ وزن د هغې ۲۴۲ ګرامه د هر یوه انار لپاره دی.
- E. **پوست غساب انار (Post ghasab)** د سمنگانو په ولایت کي پیدا کيږي.
1. د دي انار شکل او شیب گرد او په خپل رنگ کي ګلابي وي.
 2. دا انار منځنۍ خوند لري او د هغې وزن د هر یوه انار لپاره ۲۵۷ ګرامه دی.
- F. **کندهاری غوژ انار** د ننگرهار او کندهار په ولایتونو کي پیدا کيږي.
1. د دي انار شکل او شیب گرد او رنگ د هغې زیر ته مايل وي.
 2. دا انار لکه څرنگه چي له نامه نه ښکاريږي، خور انار دی او د هغې وزن تقریباً ۲۳۴ ګرامه د هر یوه انار لپاره دی.

د زده کونکو لپاره د انارو مختلفي نوعي برابري کړئ. په هغه صورت کي چي د اناروي نموني يا بیلگي شتون ونه لري پس د زده کونکو لپاره د انارو تصویرونه يا انځورونه ښکاره کړئ. له زده کونکو نه پوښتنه وکړي چي آیا د انار کومه نوعه يي تر اوسه پوري خورلی ده؟ (هغه زده کونکي چي ځواب يي مثبت دي یوازې دي خپل لاسونه پورته ونیسي). له دي وروسته زده کونکو ته د افغانستان نقشه ښکاره کړئ او له هغوي نه غوښتنه وکړئ ترڅو چي هغه ولایتونه چي د انارو مختلفي نوعي تولیدوي، په نقشه کي په نښه کړي.

بیا کتنه\خلاصه يا لنډيز: د زده کړو موخو څخه په استفادې سره لوست خلاصه يا لنډيز کړئ. له زده کونکو نه غوښتنه وکړئ ترڅو چي د هري موخې پوري تړلي منځ پانگي تشریح کړي. د هغوي له ځوابونو څخه د یوه بنسټ په توگه د هغو موخو د تعین او ټاکنې لپاره کومي چي د بیاکتنې لپاره مختلفو تگلارو ته اړتیا لري، تر استفادې لاندې ونیسي. له هغو سوالونو څخه چي د پاورپواینټ په ۲۱ شمیره سلايد کي شتون لري هم په دي برخه کي استفاده کولی شی.

تطبيق او عملي کول: زده کونکي په څو گروپونو باندي تقسیم کړئ او هر یو گروپ د انارو په یوه نوعه باندي توظيف کړئ. له زده کونکو نه غوښتنه وکړئ ترڅو چي د خپلو مربوطه نوعو په برخه کي تحقیق يا څیړنه وکړي او د معلوماتو رساله يا مقاله د خپلي هري نوعې لپاره تهیه کړي. وړه رساله باید چي په تصویرونو، د رشد او نمو په معلوماتو، فزیکي خصوصیاتو او مهمو نورو معلوماتو باندي مشتمله وي. له دي نه وروسته ټول معلومات د یوې واحدې رسالې په مخ وليکي او د هغې کاپي تهیه او زده کونکو ته يي توزیع کړئ.

ارزیابی: ارزیابی باید د زده کونکو په لاسته راوړنو باندې متمرکز وي کومه چې له درسي موخو څخه وي. په دې برخه کې مختلف تخنیکونه د استعمال وړ دي، د بیلګې په توګه په غوښتنیزو فعالیتونو باندې د زده کونکو اجرا کونې. په لیکلې بڼه امتحان یا ازموینه ددې درسي مواد شامله دي.

نمونه یې امتحان ته ځوابونه:

لنډ ځواب

- 1) د انار نبات له کوم ځای څخه سرچینه اخستی ده؟
انارو د افغانستانو له اطرافو او هم د هماليا د غرونو نه په شمالي هندوستان کې سرچینه اخستی ده.
- 2) د انار لپاره غوره خاوري او نم ویستل شوي خاوري د هغیو د رشد او نمو لپاره کومې دي؟
انار په عادي خارو او بڼه نم ویستل شوو خاورو (well-drained) کې لوړه نتیجه ورکوي، همدارنګه په چونه لرونکو خاورو او لوم تیزابي او یا هم په جغل لرونکو خاورو کې بڼه او په زړه پوري نتیجه ورکوي.
- 3) د انار د تکثیر لپاره ترټولو غوره میتود یا کرنلاره تشریح او روښانه کړي.
4) آرېل (aril) څه دی؟
د تخم(د میوې دانه) ضمیمه یې پوښښ دی . یا هم داخلي کڅوړه ده چې د میوې د اوبو (juice) پواسطه ډکه شوي وي او د سپین نما لرونکی مغز (pulp) پواسطه احاطه شوي وي.
- 5) د دې لپاره چې د انار بڼه ذایقه او خوند په لاس راوړل شي پس د میوي ورکولو په جریان کې د حرارت کومه درجه لازمه ده؟
د دې لپاره چې لوړ کیفیت لرونکی د انار میوه په لاس راشي پس د انار ونه باید چې په ګرم ځای او د لمر نه په غني برخه د حویلی یا باغ کې ځای ولري اگر چې د گل ورکولو وخت او د هغې درشد وخت تر یوې اندازې پوري په سویری کې صورت نیسي.
- 6) د انار کامله یا رسیدلی ونه تشریح او روښانه کړئ.
د انار میوه هغه وخت پخه بلل کیږي چې برجسته رنگ ته انکشاف ورکړي او هرکله چې ووهل شي(ورو ضربه) نو فلزي اواز ورکړي.
- 7) د مطلوبو شرایطو لاندې انار د څومره وخت لپاره زیرمه کیدلی شي؟
د مساعدو او مطلوبو شرایطو لاندې د انار میوه له غوټې کولو نه وروسته د ۵ نه تر ۷ میاشتو په موده کې پخیري(mature).

امتحان (ازمونه)

شپږم لوست : د انارو توليد (Production of Pomegranate)

لومړۍ برخه: لنډ ځواب

رهنمايي (لارښوونه): د دې لپاره چې لاندې سوالونه مو ځواب کړي وي، لطفاً تاسې د هغې سره تړلي معلومات برابر کړئ.

(8) د انار نبات له کوم ځای څخه سرچينه اخستی ده؟

(9) د انار د نمو او رشد لپاره غوره خاوري او نم ويستل شوي خاوري کومې دي؟

(10) د انار د تکثير لپاره غوره ميتود يا کرنلاره تشریح او روښانه کړئ.

(11) آریل (aril) څه دی؟

(12) د دې لپاره چې د انار بڼه ذابقه او خوند په لاس راوړل شي پس د میوي ورکولو په جریان کې د حرارت کومه درجه لازمه ده؟

(13) د انار کامله يا رسيدلی ونه تشریح او روښانه کړئ.

(14) د مطلوبو شرايطو لاندې انار د څومره وخت لپاره زيرمه کيدلی شي؟