

C برخه: د چرک پالني منجمنت او اداره

درېم لوست: د الوتونکو د صحت منجمنت او اداره

اصطلاح گاني

- All-in, all-out د فارم داخل ته د هم عمر لرونکو چورگورو داخلول او په عين وخت کي له فارم څخه مارکيټ د هغوي ويستل
- Intranasal vaccination د الوتونکو په پوزه کي د واکسين تطبيقول (چرگ)
- Intraocular vaccination د الوتونکو په سترگه کي د واکسين تطبيقول (چر)
- Wing web vaccination د واکسين تطبيقول د وزر په پوستکي کي د پيچکاري په شکل سره



۱ . دا چي د الوتونکو يوه گلہ يا رمه د اطاق يا کوتي په داخل کي (مرغانچه کي) په بند ډول سره ساتل کيږي او يا هم دا چي هغوي ته په ازاده ساحه کي د ازادانه گرځيدني لپاره اجازه ورکول کيږي، د هغوي صحت اوس هم يو بحث دی او بايد چي تنظيم کړل شي.

A . که چيري الوتونکي په مرغانچو کي ساتل کيږي نو په دي صورت کي د وقفې په منځ کي يوه کرنه يعني هغه وخت چي يوه گلہ له فارم څخه خارج او مخکې له دې څخه چي نوي گلہ ورته راوړل شي بايد په لاندي توگه تري څارنه سرته ورسيري.

۱ . ټول سامانونه دي له کوتي څخه وويستل شي او هغه دي پاک ووينځل شي.

A . ټوله سره دي وويستل شي او کوته دي ضد عفوني کړل شي او پاک دي ووينځل شي.

B . ټول سامانونه د لمر له وړاندي کيږدي ترڅو د مضره بکټرياوو په لري کولو کي مرسته وکړل شي.



۲ . له کوټي څخه دي د فرش ټول مواد او سره لری کرل شي.

A . چي په دي تراشلو کي د ځمکي سطحه هم شامله ده.

B . د نازکي طبقي په ډول د حیواني سري ځای په ځای کول په هغه ځمکه کي چي د نورو چرگانو لپاره ورڅخه استفاده نه کيږي.

۳ . دیوالونه او چت چارو او پاک کړی.

۴ . له اوبو څخه په ډیر فشار سره کار واخلي، او د کوټي داخل تراش کړی.



@poultrykeeper.com



- ۵ . د کوتي داخل د قبول شوو ضد عفوني کونکو موادو پواسطه دوا پاشي کړی.
- B . د اوبو او خوراکی لوښو ته د ضد عفوني کونکو درملو له داخلیدو څخه مخنیوی وکړي.
- ۶ . پاک، نوی او وچ مواد د فرش لپاره د کوتي په داخل کي واچوی.
- ۷ . کوته یا اطاق د دوه اونيو لپاره خالي پریردی ترڅو د هري شتون لرونکي ناروغی د ژوندانه دوران له منځه لاړ شي.
- ۸ . د حشراتو (pests) د نسل اخستني حایونه له منځه یوسی.

B . د امکان تر حده ملاقات کونکو ته د کوټي د ننوتلو
لپاره اجازه مه ورکوی.

۱ . ملاقات کونکي يا هم میلمانه کیدلی شي چي بکتریاوي
او ویرسونه له خپل ځان سره د کوټي داخل ته راوړي
او د وژونکو ناورغیو سبب او لامل وگرځي

C . مړه شوي چرگان د کوتي يا اطاق له داخل نه لری کړی څومره چي امکان ولري هغه پيدا کړی او لري يي کړی.

۱ . مړه شوي چرگان بايد چي له ذکر شوي فارم څخه وړاندي يوسئ او هغه په يوه کنده کي بنځ کړی او يا هم ويي سوزوی.

A . له مړه شوو چرگانو څخه تر هغه وخته پوري استفاده ونه کړی ترڅو چي يي د مړيني لامل څرگند شوی نه وي.

B . د الوتونکو ځني ناروغی انسانانو ته سرايت کوي.



۱۱ . د چرگ پالنې په اداره او منجمنت کې حفظ الصحه يو پير مهم ميتود او فکتور گڼل کيږي.

ولي ځني نوري عملي او کرنې هم شتون لري چې صحت د ادارې په برخه کې په پام کې نيول کيدلی شي.

A . له ناروغۍ څخه پاکه گټه اخستل له ناروغۍ نه د پاکو چرگانو د اخستلو پواسطه.

۱ . د الوتونکو اکثره توليدونکي د خپلو چرگانو د پلورلو څخه دمخه هغوي د ناروغيو لپاره معاینه کوي.

۲ . له توليدونکو څخه دي پوښتنه وکړل شي چې ايا هغوي د واکسين کولو، او د منجمنت د نورو عمليو په برخه کې کوم اسناد لري چې ويې ښايي.

B . په فارم کي هغه چرگان وساتل شي چي عين عمر لرونکي وي.

۱ . چي دا کار د All-in,all-out سيستم نه په استفادي کولو سره صورت نيسي.

۲ . د All-in,all-out مفهوم دا دی چي ټول چرگان په يوه وخت کي فارم ته راوړل شي او هم دي په عين وخت کي له فارم څخه خارج کړل شي (مارکيټ ته)

۳ . که چيري په فارم کي مختلف عمر لرونکي چرگان شتون ولري هغو د ۴۰ فوټو فاصلي په اندازي سره يو له بل نه وړاندي وساتي.

C . د نسلي چرگانو گله يا رمه له نورو چرگانو څخه وړاندي او لری وساتي.

۱ . دي ته دي ترجيح ورکول شي، هر کله چي نسلي چرگان Breeders په فارم کي ساتل کيږي نو د نورو نسلونو له پالنې څخه دي ډډه وکړل شي.

- D . نور الوتونکي(وحشي) له فارم څخه وړاندې تر ساتنې لاندې ونیسئ. یا هم د چرگانو له گلو نه دي وړاندې وي.
- E . د فارم په داخل کي دي د چرگانو لپاره د مناسبې هوا جریان مساعد کړل شي.
- F . پري نه ږدی چي مورکان اطاق یا کوټي ته داخل شي.
- G . بیلانس شوی غذايي جیره دي چرگانو ته ورکول شي ترڅو له خوراکی څخه د منځته راتلونکو ناروغیو څخه مخنیوی وشي
- H . چرگانو ته باید چي پاکي او تازه اوبه برابری کړل شي.
- I . د ټولو چرگانو یو ریکارډ باید چي ولری چي په دي ترتیب سره دا افهام وشي چي څه وخت چرگانو واکسین شوي، د کومو ناروغیو ستونزي لري، او له کومو نوعو درملو څخه استفاده شوي ده.

III. د گلي يا رمي سايز (اندازي) او همدارنگه نظر د چرگانو نوعو ته د واکسينونو کولو يو ضروري عمل دی ترڅو چي د اکثره ناروغيو له خپریدو څخه مخنيوی صورت ونيسي.

A . د واکسينونو کول د صحت د مناسب منجمنت لپاره ځای نيونکي نه دي بلکه اکثره د ناروغيو له کنترولو سره مرسته کونکي دي.

۱ . د اکثره نوعو د ناروغيو لپاره واکسينونه شتون لري په شمول bronchitis ، fowl fox ، fowl cholera او نورو ناروغيو.

B . واکسینونه باید چي په هغو ځایونو کي استعمال کړل شي چي په هغې ځای کي ناروغي پیژندل شوي وي.

۱ . زیات واکسین کول یا نامناسب واکسین کول دي سبب کيږي چي نوموړي ناروغي د مخصوصو واکسینونو په مقابل کي مقاومت پیدا کړي.

۲ . د واکسین کولو پروگرام باید چي د ګټني اخستني مطابق او هم د محیط سره سم پلان شوي وي.

۳ . د واکسین کولو په برخه کي د خاص تفصیل لپاره د محلي یا ځای د توسعي له نماینده سره په تماس کي شی.


C . واکسین د چرګانو د ازار یا فشار لامل کيږي په دي لحاظ چرګان باید هغه وخت واکسین کړل شي چي صحتمند وي.

- D . د واکسین د تطبیقولو لپاره مختلفي طریقي یا لاري شتون لري.
- ۱ . په خاصه توگه چرگان د , Intransally Injection او
Wing web ، Intraocullary په طریقو سره واکسین کيږي.


A. Intranasal vaccination : په مستقیمه توگه د پوزې په سوری کې د واکسین خای په خای کول.



Intraocular vaccination: B . په سترگه په مستقیمه توګه د واکسینونو
ځای په ځای کول.



C. Wing vaccination: د وزر د پوستکی په داخل کې د پیچکاری پواسطه د واکسین کولو له پروسې نه عبارت ده.



۲ . هغه واکسین چي د ټولو گلو لپاره تطبیقیري اکثره د اوبو له لاري یا هم د سپري spray یا dust په شکل سره صورت نیسي.

A . استعمال شوی میتود یا تگلاره د کنترولیدونکی ناروغی پوري اړه لري.

B . په انفرادي یا یوازي توگه واکسین کول نسبت د کلي په ډول واکسین کولو ته د زیات فشار او ازار لامل ګرځي.



F . د ناروغي نه مخنيوی نسبت د ناروغي کنترولولو ته اسان کار دی.

۱ . د چرگانو گله باید هره ورځ د ناروغي د علايمو لپاره وازمويل شي.

۲ . د خوراکي او اوبو ناڅاپي کمول د صحي ستونزو له علايمو يا نښو نه گڼل کيږي.

۳ . که چيري يو فيصد گله ناروغه وي په دي حای کي ناروغي شتون لري.

- ۴ . د مړینې اندازه د ناروغۍ یوه بله معمولي نښه یا علامه بلل کېږي.
- A . د مړینې نارمل اندازه له لومړیو درې اونیو کې په درې وانی لرونکو چورگورو کې تقریباً ۲ فیصده ده.
- ۱ . په فیل مرغانو کې دا اندازه ۳ فیصده تجربه شوي ده.
- B . له دریمې میاشتي څخه وروسته د مړینې اندازه په هره میاشت کې له یوه فیصد نه تجاوز باید ونه کړي.
- C . په اندازه کې ناڅاپي زیاتیدل د ناروغۍ له علایمو یا نښو نه شمیرل کېږي.

۵ . حني له ناروغيو څخه يوازي په لابراتوار کي د دقيقو
معایناتو پواسطه تشخيص کيدلی شي ولي کم له هغوي نه په
فارمونو کي تشخيص کيږي.

A . د ناروغی د علايمو يا نښو په وخت کي محلي وترنر
ډاکټر يا د توسعي مامور سره د مشوري لپاره په اړيکه کي
شی.

B . د نمونو يا بيلگو د راټولو لپاره هر يو لابراتوار مختلفو
اړتياوو يا ضرورتونو ته اړتيا لري.

لنڊيز | بيا کتنه

- ۱ . د الوتونکو لپاره د حفظ الصحوي عملياتو د کړنې تشریح او روښانه کول.
- ۲ . د صحت د منجمنت او اداري نوري کړنې کومي چي په چرگ پالنه کي استعماليري.
- ۳ . د الوتونکو واکسين کول.