


د فصلونو د سرخی اهم امراض

IMPORTANT RUST DISEASES :-

CEREALS - STEM RUST
(Puccinia graminis) په غنمو کې د ساقی سرخی
ژیریه سرخی.

(P.striiformis) په خسته لرونکو میوه کې (Tranzschelia discolor)



ژیره سرخی په غنمو کې



دساقی سرخی په غنمو کې

په بادام، شفتالو کې د سرخی مرض



دپیاز او اوره کې سرخی



UC Statewide IPHT Project
© 2000 Regents, University of California

توضیحات: دغنموهمی سرخی دنتی یاتوره سرخی پټی سرخی چه زیره سرخی هم ورته وایی او دپاتو سرخی یا نصولاری سرخی ده په دی وروستیو کی یوه مهمه سرخی چه د 4G99 دافغانستان د غنمو کروندی تهدیدوی. که چه هم چه مقاوم انواع معرفی شویدی خو زیره سرخی اوس هم لیدل کیږی په خسته لرونکو میوو او سبو کی لکه لوبیا او پیار کی لیدل کیږی.

اکثراً د سرخی مرض ژمی په ژوندیو انساجو کی تیروی. په پسرلی کی کله چه هوا توده شی سپورونه خارجیری تر څو چه نوی ودی اخته کری. په اوری کی باد سپورونه اوږدی فاصله کی انتقالوی خولمنبل هم مهم دی ځکه چه ۱۰-۲۰ساعتونه د ودی لپاره پکار دی. په غنموکی د ساقی سرخی لوری درجی تودوخی ته ضرورت لری معتدله شپه ۲۰-۲۵ درجی د سانتي گراد او معتدله شپه ۲۰-۱۵ سانتي گراد له شبنم سره یو ځای خو نوری سرخی یخی درجی ته ضرورت لری.

مثلاً د فاصلی سرخی ۲۵-۱۶ او د خسته لرونکی میوی ۱۳-۲۶ درجو پوری ضرورت لری.

نظارت او تفتیش : غله جات باید په منظم ډول ترنظارت لاندی وی اوکله چه د سرخی مرض شیوع ولری باید د کرنی وزارت ته اطلاع ورکړل شی.

په نوروفصلونوکی بایدهفته وار سرخی چک شی او که مساعده شوه تداوی باید شروع شی او که علایم په ټوله شوی میوه کی ولیدله شوه نو باید چه په اینده فصل کی پخوالدی چه علایم ولیدل شی تداوی شی.

مخنیوی: په سبو کی زراعتی تناوب او د کروندی حفظ الصحه مراعات شی.

په غلو کی سرخی په عنعنوی ډول د مقاومو انواعو په واسطه کنترول کیږی خو د مرض د نویو انواعو پیدایشت چه د وایی خاصیت لری مثلاً ژیره سرخی په ۱۹۸۰ او 4G99 په ۱۹۹۹ کی دایمی تهدید ده فعلاً دغنموانواع دی 4G99 په مقابل کی مقاومت نلری او تداوی(دوا پاشی) اقتصادی نه تمامیری.

د ساقی سرخی په مقابله کی کولای شو د کبنت تاریخ بدل کرو او داسی انواع دغنمو وکرو چه په لنډ فصل کی درسیږی او داسی انواع چه ژر ورسیږی. ترڅودی مرض نسلونو تعداد راټیټ کرو. اودمرض کوربه (زرشک) له مینځه یوسو، اویاځینی نباتات چه دامرض لری اویه خرابوکی وده کوی له مینځه یوسی. دی سرخی په هکله باید دی حفاظی او ترویج ریاستونو ته رپورت ورکړشی ترڅوچه وپېژندل شی.

کله چی سرخی میوه اوسبوکی ولیدل شی سټیب لورډین فارچ وژونکی توکی استعمال شی. آزاکسی نترابین اویه متاوب ډول PMT فارچ وژونکی استعمال شی. (مایکروبیوتاینیل، پاتیبیوکونازول) ترڅواخته توب له مینځه یوسی. کلوروتالونیل چی په پسرلی دنوروامراضولپاره واچول شی. سرخی ته هم گټه کوی.