



خوانه حشره



د روميانو په پانه کې د هگيو پونکي او واره  
بجي



کفشک د غنمو په وري باندی

بوین خسک چي د ناک میوه یی خرابه کړیده



# پوښن شوي خسک، بوښن خسک او کفشک

توضیحات :-

پوښن شوي خسک په مختلفو فصلونو اثر اچوي . په ناکو او رومي بانجانو کې د ميوې شکل بد رنگه کوي .دې کفشک دې خسک بچي او خوانان دواړه غلو ته ضرر رسوي يعني پاني ، تنې او دانې ته د حاصلاتو کمښت عموماً دې ۲۰ - ۳۰ فیصدو په حدود په وریشو کې تخمین شوي دي خو په غنمو کې له ۵۰ - ۹۰ فیصده پورې وي . د حاصلاتو له کمښت نه غیر د ا حشره داسې مواد په دانه کې ترزیق کوي چه دې نوډي پخولو کیفیت راټیټوي .

تفتیش او نظارت

د حشراتو دودې مرحله	د فصلولودې ودي مرحله	له اقتصادي نظره دې افت شروع
1	په غنمو کې د شاخونو ویستلو اغیز	کله چه په یوه متر مربع کې له ۲ څخه زیات وي
2	بچي	کله چه په یوه متر مربع کې له ۵ - ۱۰ پورې وي
3	بچي او خوانه	کله چه په یوه متر مربع کې له ۵ - ۶ پورې وي

د کفشک بالغه حشره په هغه ځای کې چه باید ژمي تیر کړي وي هله مهاجرت کوي چه دې تودوخي درجه  $C^0$  ۱۵ شي نو کله چه د دې حشرې نظارت کود باید په یو متر مربع کې وکتل شي چه ۹۰ فیصده حشراتو مهاجرت کړي وي . همدا رنگه لازمه ده چه دې ژمي تیرولو ځایونه هم وکتل شي .

مخنیوي :- په دې حشروکې مونږ دے IPM سپارښت نشو کولای هغه د غنمو انواع چه وخته پخیرې ښاني دې کفشک له شدید یرغل نه یو څه بچ شي .

مصنوعي با پرونزاید لکه سایپر مټیرین، لمبدا سایپالوتیرین ، باے فشرنگ او چاکلورپاي ره فوس باید دې کفشک په ملی مبارزه کې وکارول شي

وخت :- په کفشک کېنې کله چه بچي دودې دوهمې مرحلې ته ورسوي خو په پوښن شويو په نورو فصلونو کې وخت ستونزمن ده دا ځکه چه دا خسکه په ورستیو وختو کې کروندې ته داخلیري دا هغه وخت دې چه دې د فصل راټولولو ته نژدې وي .