

د نارجانو د کورنی د پانی چینجی

LEAF MINERS (CITRUS LEAFMINER—*Phyllocnistis citrella*)

چینجی په پانو او میوه کی



بنیته په بتیئی خاله کی



خوان پتنگ



دلته خوانه او بتیئه حشره یو خای بنکاری



توضیحات: CARDS

سوری کوونکی چینجیان په مختلفو حشراتو پوری اړه لری اوډیری میوه لرونکی ونی اوسابه تر یرغل لاندی راوړی. دنارنجودخانان چینجی چی دپانی پرمخ بڼکاری دپتنگ کورنی چینجی ده. نورچینجی مچانو،مچیو ،غالبوزو اوگونکتو پوری اړه لری . دنتاکوپه شکل خاپونه چی په پانه کی بڼکاری داسی خای دی چی واره چینجیان دپانی له منځ څخه یعنی دلوری اوتبئی طبقی په مینځ کی اوسیری اودپانی دمینځ پسته برخه دی چینجیو په واسطه خورل شوی اودنازک کاغذپاس اولاندی برخه پاتی وی یو نوع پرازیتی مچی د چینجیوپه مینځ کی هگی اچوی دا اوکله چه رنگ ئی تغیر وکری دا حالت بڼکاریری.

کله چه حشره وژونکی کیمیاوی توکی ولرول شی دا ستونزه لا پسی زیاتیری دا ځکه چه دا کیمیاوی مواد د چینجیانودبڼمن یعنی مچی له مینځه وری او چنجی لاپسی زیاتیری.

تفتیش اونظارت :-

له فیرومونی تلکونه کارواخلی ترخودپانوبالغ نر حشرات معلوم کړو چه څه وخت ددی چینجیونفوس زیات دی.خوکله چه دمخنیوی تصامیم نیول کیږی باید د فعالو چینجیونفوس په اساس وی چه له دری کلونو او کم عمره ونوکی موجود وی څارنه یا نظارت باید په هله پیل شی چه په ۵۰ فییصده ونو کی چینجی پیدا شوی وی.

په تصادفی ((Random ډول لس پانی له مختلفو ځایونونه راوړی اودعدسی په واسطه چینجی پکینی معاینه شی خوانی ونی چه تر ۳۰ فیصدوپوری چینجی شوی وی اوژوندی چینجی پکینی وی بایدواپاشی شی خو زری ونی ترهغه وخته چه شدیداً اخته شوی وی دوا پاشی شی .

مخنیوی :-

څرنګه چه دا چینجی دپانود دوو طبقوترمینځ پوښ شوی نو له کیمیاوی تداوی سره زیات مقاومت لری خو پرازیتی مچی په طبیعی ډول شتون لری اغیزمنی دی خو که ضرورت پېښ شی نوله ابامکتین اوامیداکلوپرایدپه خاوره کی دخاڅکیودابولګولو په واسطه او یا سپینوساید وکارول شی.همیشه په دواپاشی کی د باغدارۍ له تیلونه کارواخلی .