Melon Fly

د خټکیو مچ

(Myiopardalis (syn. Carpomyia) pardalina)

دختکیو مچ دجماع په حالت کی

دختکیودمچ بتیتی

د ختکیومچ چی هگی اچوی

دختکیودمچ په واسطه خراب شوی
ختکی راټولول او دا ختکی باید له مینځه
یوورل شی

ختکی چه دمچ پواسطه اخته شوی دی
دخروج لپاره سوری چی چیبجی
داستراحت (بتیته) لپاره وتلی دی

MELON FLY د خټکيو مچ

توضيحات: دی مچ ته چی کله کله دبلوچستان مچ هم وايی. دامچ دافغانستان په کوټ کوټ کی پيداکيږی. خو M. Pardalina شمالی برخوته له ۲۰۰۲ميلادی کال راپديخوار اپيداشويدی. دامچ خواږه خټکی اخته کوی خويه بادرنګی کی هم پيداکيږی. داسی خټکی نه يوازی چی داستفادی وړندی بلکه داسی خټکی خارج ته هم نه صادريګی. ځکه چی دا حشره قرنطينی ده. کله کله چی له حدنه زياته دواپاشی وشی نومقاومت هم پيداکوی. له ۸۰ نه تر ۹۰ فيصده اخته خټکی ضايع کيږی.

داحشره (مــچ) دبتيتی په شکل ژمی تيروی چی له ۵ نه تر ۱۵ سانتی لاندی په خاوره کی وی خوتر ۵۰ سانتی متره لاندی وی هم مقاومت کولای شی. داحشره دجوزاپه مياشت کی کله چی فاليزکی ګلان بچی اچوی راوزی. کله چی واچولی شی په دری ورځوکی چينجی کيږی. اوله ۸ نه تر۱۸ ورځولپاره په خټکی کی تغذيه کيږی. ورروسته په خټکی ياخاوره کی داچينجيان په بتيته بدليږی اوله ۱۳نه تر۲۰ ورځوهلته اوسی. داحشره په اوړی کی ۳نسله توليدوی.

نظــارت اومعــايــنـه: ددی حشری لپاره تفتيش اونظـارت ترډيره حده پوری دی. فصل محلی معلوماتوپوری اړه لری. همدارنګه دپروسږن فصل په هکله معلومات خوناريـنه مچ لپاره تلک نشته.

دمخنيوی لاری چاری: ددی مچ بتيته له اختـه شوی خټکی لاندی خاوره کی موقعيت لری. ژوری يوی اوغرق آب کول ددی حشری په مخنيوی کی ګټه نه کوی. حتی ديوه فصل غنومقاومت هم لری. دمخنيوی لپاره بايد ټول خټکی ټول شی اودخټکی ځای کی کاربوريل(سيوين) وپاشل شی. دااخته خټکی بايداقلاً ۷۰ سانتی له خاوری لاندی خښ شی. خوپخواله خښيدوځاه بايد په Seven اوچونه ګردپاشی شی.

دمخنيوی يوه اغيزمنه طريقه داده چه له ګرده افشانی نـه وروسته ژرترژره ميوه (شينکی) په خلطه کی واچول شـی. پـه نوروهيوادوکی دايـوه اغيزمنـه طريقـه ده خواقتصـادی پـه افغانستان کـی نـده معلوم. دلتـه ورځپانی ډيری کمی دی. چی خلطـی ترينـه جوړی شـی. اوقيمتونـه هم ټيټ دی خوکولـی شـوچی تجارتـی خلطی له چين څخه راواردی شی.

پخوادهګيوداچولونه بالغ مچ مجبورنده چی خواږه اوخـــــــــری. نوزهری طعمه هم اغيزمنه نده. که فاليز له پروسږن فاليزڅخه ۵۰۰ متره فاصله ولری نوويلترامترين بايد دواپاشی شی کله چی شينکی دزردآلوپه اندازه وی اودخوورځويه وقفه کی بايد داکار تکرارشی خوددوامقداراودميوی توليدووخت ته بايد پام وشی (هغه وخت چی آخری دواپاشی اوتوليدل وشی).