

خیمه یی چینجیان یانوکربتنگان

TENT CATERpillars—LACKEY MOTH (*Malacosoma neustria*)



چینجی په خیمه کی



نوکربتنگ چینجی



دخیمی چینجیودهگپورتولگه

توضیحات: ددی چینجیانوچی زیات تاوان رسوی اوپانی اومیوه له مینځه یوورل شوی ده رپورت ورکرای شویدی. دی حشری ټول انواع چی په افغانستان کی پیداکیږی یوشان ندی. خونوکر پتنگ *Lockey moth* په افغانستان کی پیژندل شوی دی چی په اروپا او آسیا کی موجوددی. داحشره له سرطان څخه ترسنبلی پوری وی او هگی دونوپه نودوکی یوځای اچوی. دابچی په حمل کی له هگی څخه راوژی. اوپه ډیرلر به خیمه کی تغذیه کیږی. اوپه جوزاکی دبیتتی په شکل راخی اوپه پبله کی پانو او چاودونوکی پاتی کیږی. خونورانوچ ددی حشری (خیمیز چینچی) خپلی خیمی په ماښام اوسهار کی پریږدی. که پدی وخت کی په خوراکی حشره وژونکو باندی دواپاشی وشی اغیزمن به وی.

معاینه اونظارت : پخوالدی چی هگی بچی شی دژمی په وروستیو وختونوکی ولټول شی. اوپه لومړیو خیمو پسی وگز ځو.

مخنیوی: هگی اوخیمی په لاس له مینځه یوسی اوباید په لاس مودستکش وی ځکه چی دامواذهری دی. داسی وخت وټاکی چی چینجی په خپلو خیموکی وی. داډیره ښه طریقه ده خوکه مقدار ډیر زیات شوی وی *Bt* باید دواپاشی شی. دایونوچ بکتریدی (*Bacillus thuringiensis*) نومیری چی نه یوازی خیمی بلکه ټولی پانی چی وروسته دغه چینجی هلته تغذیه کیږی باید دواپاشی شی. همدارنگه سایپر مترین له لمدوونکو اویاچی دمیخلوله مایع سره گدشی. ترڅو چی په خیموکی لاندی ولاری شی. که څه هم پدی طریقه کی دښمن متاثره کیږی خودایوه ډیره اقتصادی طریقه ده. داکاردگل په وخت کی مکوی ځکه چی دشاتومچی به مری کری.