

**(E) برخه: د مغز لرونکو او غیر مغزي
میوو تولید**

**شیرم لوست: د انارو تولید
(Production of Pomegranate)**

اصطلاح

- **Aril** آريل يا د تخم (د ميوي د داني) ضميمه يي پوښښ يا داخلي كيسه چې د ميوي د اوبو (juice) پواسطه ډکه شوي وي او د سپين نما لرونکی مغز (pulp) پواسطه احاطه شوي وي

● انار چي لاتيني يا علمي نوم يي **Punica granatum** دی د نړی له عالي يا لوړو میوو څخه شمیرل کیږي.

— انارو د افغانستان له اطرافو او په شمالي هندوستان کي د هماليا له غرونو څخه سرچینه اخستی ده.

● انار د مدیترانې (Mediterranean) په ټوله سیمه کي له پخوانیو زمانو څخه اهلي او محلي شوي دي.

● انار په ټول سراسر هند کي او د جنوبي آسیا په وچو برخو، مالیا، ختیځ هند او د افریقا په وچو منطوقو (tropical) کي کښت او شنه کیږي.

» د انار د کښت او کرنې لپاره تجارتي اساسي منطقي
په نړۍ کې منځنۍ ختیځ، هندوستان او د هغې چاپیره
هیوادونه او هم جنوبي اروپا څخه عبارت دي.

» د انار میوه پرته له څیرني او مطالعي څخه خوړل
کیري.

» د انار میوه (Pomegranate) ډیری د جوس په
شکل سره په مصرف رسیري او د هغې جوس په
څو طریقو سره جوړیدلی شي.

» د انار جوس په تازه شکل، شربت، جیلی او
ساس (bug) شکلونو سره خوړل کیدلی شي.

» د انار تجارتي شربت د grenadine په نامه سره
پلورل کیري.

- انار په نیمه وچ اقلیم کې او همدارنگه په معتدله حرارت درجه او نیمه حاره منطوقو (subtropical) کې رشد او بڼه نمو کوي او په طبیعي توګه په هغو منطوقو کې چې د یخ ژمې او ګرم اوړی لرونکي وي خپل ځان عادت کولی شي.

— مرطوب اقلیم یا هم نمناکه اقلیم د انار په میوه باندې په منفي توګه تاثیر لري.

- په هغه صورت کې چې د حرارت یا تودوخې درجه له منفي یولسو څخه ښکته شي د انار میوه په جدي توګه صدمه ګوري.
- د انار ونه په کانتینر او ځني وختونه په ګلخانو کې په میوې ورکولو باندې پیل کوي.

• د انار ونه د گلبن بوټي ته ورته شکل يا هم گړد د وړي وني شکل لري چي له ۶ نه تر ۹ مترو پوري رشد او نمو کوي، ولي په عامه توگه د انار وني اوږدوالی له ۳،۵ نه تر ۴،۸ مترو پوري وي.

- د انار ونه د لنډ قد لرونکو نوعو په نامه سره هم شهرت لري.
- د انار نبات يو پاني غورخونکی ونه ده، ولي په ځنيو ساحو کي خپل پاني ساتلی شي.
- د وني تنه (trunk) د سور خرمايي پوستکی پواسطه پوښل شوی ده چي وروسته يي رنگ خاکستري کيږي.
- » د انار د وني بناخونه سخت، هډوکين او معمولاً د اغزو (spiny) پواسطه پوښن شوي دي.
- » د انار ونه په قوي توگه ميلان لري ترڅو چي لاندنيو بناخونو sucker ته له بيخ يا قاعدې څخه رشد او نمو ورکړي.



- » د انار ونه هم د اوږده عمر لرونکو ونو له جملې څخه گڼل کيږي. په اروپا کې د انار داسې نمونې يا بيلگې شتون لري چې له ۲۰۰ کالو څخه زيات عمر لري.
- » د انار د ونې شينوالی او حوانې تقريباً وروسته له پنځلس کلونو څخه کميږي او د هغې درشد او نمو قوت کميږي.
- » انار هغه نبات دی چې خپله په خپله گرده شيندونکی (self-pollinated) دی ولي د حشراتو پواسطه هم غير خودي گرده شيندل (cross-pollinated) يې سرته رسيدلی شي.
- » غير خودي د گرده شيندل (cross-pollinated) د ميوې اندازې ته زياتوالی ورکوي.
- » د باد پواسطه د گرده شيندل بي معني او کم اهمته دي.

- انار تقريباً گرده يا مدوره قيافه يا شکل لري او له ۶ نه تر ۱۲ سانتي مترو پوري عريض وي او په خپله نوکه كي د كاليكس پواسطه تاج لرونكي يا كاكلي شوي دي.

» كاليكس له هغي كاسي نه عبارت دي چي كاسبرگونه په هغي باندي حاي لري

– د انار پوستكي سخت او خرمني ته ورته دي چي معمولاً د هغي رنگ گلابي او تند سور وي.

– د انار د نني برخي د غشايي ديوالونو پواسطه چي خو وړو برخو يا قطعاتو (compartments) باندي جلا شوي دي او دا كيسې د جوسي پلپ pulp يا اريل aril پواسطه په سور گلابي سپين رنگه نما سره بسته بندي شوي دي .

» د هري كيسې يا چانتي (sac) په منخ كي يوه نرمه دانه يا سخته تيره دانه شتون لري.



» د دې لپاره چې د انار مزه او خوند په لوړه کیفیت سره په لاس راشي پس د میوې ورکولو په وخت کې د هغې لپاره د حرارت لوړه درجه لازمي او ضروري ده.

» د انار ونه بنایي چې له خنبولو نه یو کال وروسته په میوه ورکولو پیل وکړي ولي له دوه نیمو نه تر درې کالو پوري وخت یې د میوې ورکولو لپاره پیر عام دی.

» د مساعدو شرایطو لاندې د انار میوه له غوټې کولو نه وروسته د ۵ نه تر ۷ میاشتو مودې پوري پخیري (mature).

• د دې لپاره چې د لور کیفیت لرونکي انار میوي په لاس راشي نو باید چې د انار وني ترټولو په گرمو او لمر لرونکو سیمو د حویلیو یا باغونو کې خای ولري، اگر چې د هغې گل ورکول او رشد تر یوي اندازې پوري په سویري کې صورت به ونیسي.

– انار په عادي خاوره کې او بڼه نم ویستل شوي خاوره (well-drained) کې لوره نتیجه یا پایله لري، همدارنگه په چونه لرونکي خاوره یا لوم تیزابي خاوره او یا هم په جغل لرونکو خاورو کې بڼه نتیجه یا پایله ورکوي.

– له دې څخه وروسته چې د انار وني بڼه خای او استقرار ونيوه پس د وچکالی په مقابل کې د ملاحظې وړ تاب پیدا کوي، ولي بیا هم د بڼي میوي دلاسته راوړني لپاره د انار ونه باید اوبه کرل شي.

» د دې په خاطر چې نوي کرل شوي نباتات بڼه خای په خای شي باید په وچ فصل (dry season) کې په هرو دوو نه تر څلورو اونیو پوري یو خلی اوبه کرل شي.

» د انار نبات د مالگینو اوبو په مقابل کې او هم د مالگینو خاورو په مقابل کې په نسبي توگه منځنی حد د تحمل کولو لري.

» د انار د هري يوي ونې لپاره په دوه لومړنيو پسرليو کي د ۵۶ نه تر ۱۱۳ گرامو پوري د نايټروجن سره يا کود ورکول کيږي، ولي ددې لپاره چي د هغې د تغذوي موادو لپاره اړتياوي معلومي شوي وي بايد چي خاوره ټيسټ (test) کرل شي يا هم د هغې لابراتواري ازموينه تر سره شي.

» دا چي نباتات ورستي شوي حيواني سري يا کود او د کلني ملچ (annual mulch) کولو نورو کمپوستونو په مقابل کي عکس العمل ښکاره کوي ولي له دوه کلونو څخه وروسته په کمې اندازې سره سري يا کود ورکولو ته اړتيا ليدل کيږي.

» د انار نبات بايد هغه وخت چي ۶۰ سانتي مترو ته ورسيري د بيا حل لپاره پري يا قطع کرل شي.

» له همدې نقطې څخه څلور يا پنځه ځوانې ساقي (shoot) پريږدي ترڅو چي رشد او انکشاف وکړي، ددي لپاره چي ونه په متوازنه توگه بڼه وي پس همدا څلور يا پنځي ځوانې ساقي په مساويانه توگه د ونې په تنه کي تقسيمي کړي.

» نلغه يا ځوانې ساقي له ځمکې څخه د ۳۰ سانتي مترو په اندازې سره پريږدي اگر چي لنډه ده ولي د ونې تنه واضح او معلومه به وي.

• هره جوانه او لاندنی بناخ (sucker) چي په پورتنی برخه يا هم د ځوانو ساقو په بنکتنیو برخو کي انتخاب شوي وي بنکاره کيري چي بايد پري او لري کرل شي

» له هغه ځايه چي د انار ميوه د ونې په راس يا څوکه کي باداره کيږي، نو په دي بنا داسي سپارښتنه کيږي چي د دري لومړنيو کلونو لپاره ښاخونه په اختياط سره لنډ کړل شي ترڅو چي د نويو ساقو اعظمي حد په ټولو سمتونو کي تشويق کړل شي او له نامنظم رشد او نمو څخه مخنيوي وشي او يو قوي نبات په لاس راوړل شي.

» له دريم کال څخه وروسته يوازي لاندني ښاخ يا بن ښاخ (هغه ښاخونه چي د ونې له بيخ نه راتوکيږي او د هغي قوت نيسي) او له منځه تللي ښاخونه له منځه يوسي يا يي لري کړي.

- » د انار ونه له تخم (seed) څخه پالل کيدلی شي ولي بسايي چي د والدينو عين ځانگړتياوو ته تبارز ورنه کړي.
- » د انار د ونې قلمي په آسانی سره ريښي وباسي او تقريباً له کال نه وروسته په ميوه ورکولو باندي راځي.
- » په ژمي کي هغه قلمي چي له ۳۰ نه تر ۵۰ سانتي مترو پوري اوږدوالی ولري له کامل نبات يو کلن بناخ څخه واخستل شي.
- » د قلمي پاني لري کړی او قلمي د ريښو ويستونکو پارونکو يا تحريکونکو موادو (rooting hormone) پواسطه معامله کړی او تقريباً دوه پر دري برخي د قلمي په خاوره کي او يا هم په بله ريښه ويستونکی وسيله (rooting medium) کي داخل کړی.
- » د انار نبات هوايي ويده (air-layered) کيدلی هم شي ولي قلمه کول په کمه توگه کيامياب کيدلی شي.

- په اکثري توگه انار نسبتاً د ناروغيو او آفاتو په وړاندي بي غمه وي.

— د پاني داغ او د ميوي داغ هغه مشکلات دي چي په انار کي شتون لري پاني صدمه د سپنو مچانو (white flies) پواسطه، پريپسونو (هغه حشره چي د گياوو شيره څښي) او لاک توليدونکو scale insects حشراتو يا پواسطه (د هغو حشراتو نوعي چي د هغي بنځينه جنس فلس ډوله ترشح کوي او د هغي لاندې هگي اچوي) منځته راځي

● د انار میوه هغه وخت پخه ګڼل کیږي چې برجسته رنگ ته انکشاف ورکړي او هر وخت چې ووهل شي(ورو ضربه) فلزي اواز ورکړي.

— د انار میوه مخکې له دې چې ډیره زیات پوخوالی (over maturity) ته ورسېږي، مخکې له دې نه چې په انار کې درزونه رامنځته شي باید وشوګول شي.

● د انار میوه هم لکه د مڼې په شان په انبار کولو او زیرمه کولو کې اوږد عمر لري.

● انار د حرارت د صفر نه تر ۵ درجو د سانتی ګریډ کې ډیر ښه ساتل کېدلی شي او د اوه میاشتو لپاره په یخو خونو کې په همدې درجه کې چې نسبي رطوبت له ۸۰ نه تر ۸۵ فیصدو پورې وي پرته له دې چې انار وروست شي او یا هم خپلي اوبه له لاسه ورکړي، ساتل کېدلی شي

● د انار میوه په زیرمه ځایونو کې غوره کیږي، د هغې جوس زیات خوندور او مزه یې اضافه کیږي.

● په افغانستان د انارو زياتي محليي يا بومي نوعي شتون لري.

— سورکندهاري انار (Sor Kandahari) د کندهار په ولايت او هغې په شاوخوا سيمو کي پيدا کيږي.

● کندهاري سور انار گرد او رنگ د هغې سور وي ذايقه او خوند يي ترش وي.

● يوه دانه کندهاري سور انار تقريباً ۲۳۳ گرامه وزن لري.

— د کاپيسا ميخوش انار

● ميخوش انار خرمایي رنگ او غټ دايروي شکل لري، په دي معنی سره چي په خپلو غاړو کي راوتلي برخي او ځنډي لري.

● منځنی ذايقه او خوند لري يعني د ترش او خوږ په منځ کي متوازن حالت د ځان لپاره يي نيولی دی او دهغې منځنی وزن د هريوه انار لپاره ۱۸۹ گرامه دی.

- **تاشقرانی انار په بلخ او ننگرهار ولایتونو کی پیدا کیږي.**

- تاشقرانی انار گرد شکل او خرمایي او سره رنگونه لري.
- ذایقه او خوند د دي انار ترش دی او تقریباً منحنی وزن د هغې ۲۴۳ گرامه د هر یوه انار لپاره دی.

- **پوست غساب انار (Post ghasab) د سمنگانو په ولایت کی پیدا کیږي.**

- د دي انار شکل او شپې گرد او په خپل رنگ کی ګلابي وي.
- دا انار منحنی خوند لري او د هغې وزن د هر یوه انار لپاره ۲۵۷ گرامه دی.

- **کندهاری غوژ انار د ننگرهار او کندهار په ولایتونو کی پیدا کیږي.**

- د دي انار شکل او شپې گرد او رنگ د هغې زیر ته مایل وي.
- دا انار لکه څرنګه چي له نامه نه ښکاريږي، خوږ انار دی او د هغې وزن تقریباً ۲۳۴ گرامه د هر یوه انار لپاره دی.

بیاکتنه / خلاصه یا لنډیز

- د انارو (Punica granatum) د تاریخچې په برخه کې بحث وکړئ.
- هغه شرایط تر بحث لاندې ونیسئ چې د انارو د رشد او نمو لپاره مناسب او وړ وي.
- د انارو د حاصل اخستلو د وخت په برخه کې څیړنه او نظر وړاندې کړئ.
- د افغانستان د انارو عامې نوعې تشخیص او تعیین کړئ.