

C برخه: د چرگ پالني تنظيمول

دوهم لوست: د چرگ پالني د سامانونو تنظيم، او غذا يا خوراکه

اصطلاح ڪاني :

- Grit وري ٽڪي
- Palatability دلچسپي

- ۱ . د چګانو د مناسبې تغذي لپاره غذايي مواد يا غذايي عناصر برابر کړئ چې د هغوي دنورمال نمو او ژوندانه لپاره ضروري او اړين وي.
- A . د چګانو په غذايي جيره کي شپږ نوعه موادو ته اړتيا ليدل کيږي، پروتين،شحميات، شکرې، معدني يا منرالي موادوويتامينونه او اوبه.
- B . د چګانو په جيره انرژي اکثره د دانه بابو او شحمو پواسطه برابريږي.
- ۱ . چګان ددي توان نه لري چې زياته فائبر لرونکی خوراکه يا غذا په مصرف ورسوي.
- ۲ . د چګانو جيري بايد تقريباً له ۵۰-۸۰ فيصدو پوري دانه باب تشکيل کړي.
- C . هرکله چې د هغوي په جيره کي دانه باب استعمالیږي بايد ميده شوي وي .
- ۱ . جوار بايد په دليدلی شکل سره ميده شوي وي.
- ۲ . جودر ، (وربشي) او Millet () په نازکه وتگه ميده شوي وي.
- ۳ . غنم بايد د ژرندي (roller) پواسطه پروسس شوي وي .

D . په غذا يا خوراکه کي بايد چي شحم له ۱۰ فيصدو نه زيات نه وي.

۱ . شحم په زياتي اندازې سره د هضم قابليت، زياته مزه، د جيري خاوره اوگړد کموي او د غذا ترکيب اصلاح کوي.

۲ . هغه جيره چي د شحم لرونکي وي پکرمه هوا کي په تيزي سره ورسټيري پرته له دي چي په کيمياوي وټگه اصلاح شوي وي.

E . پروټينونه هغه ضروري امينو اسيدونه چي د چځانو لپاره په خوراکه کي اړين دي تهيه او برابروي.

۱ . ډير عام امينو اسيدونه کومو ته اړتيا ليدل کيږي عبارت دي له ارجنين، لایسین، میتیو نین، او تريپتوپان څخه.

۲ . د پروټين عمده زيرمي د الوتونکو په جيره کي له سايوبين، غوښي، د غوښي پاتي شونو او کب له پوږو نه په لاس راځي.

F . اوبه يو ډير مهم عنصر دی چي د الوتونکو د بدنه لويه برخه تشکيلوي.

۱ . د چرگ عمر د اوبو مصرف تعينوي.

A . د برايلا يا غوښينو ۱۰۰۰ قطعي چکانو مصرف په يوه ورځ کي په حدود د ۲۰ ليټرو د يوي اونۍ په عمر کي وي او ۳۸۰ ليټره په اتمه اونۍ عمر کي اړيني دي.

B . هډۍ ورکوني نوعي چي هډۍ ورکولو ته نژدې وي ۱۰۰۰ قطعي په يوه مياشتني عمر کي ۲۰ ليټرو اوبو او ۲۰ مياشتني عمر کي ۱۷۰ ليټره اوبو ته اړتيا لري.

C . په نسلي او هډۍ ورکونکو ۱۰۰۰ قطعي چکانو کي په يوه ورځ کي ۱۸۹ ليټره اوبه په مصرف رسوي

۲ . د تودوخې د درجې لوړوالی هم د اوبو مصرف زياتوي.

A . چکان پگرمو ورځو کي نسبت يخو ورځو ته دري چنده زياتي اوبه په مصرف رسوي

G . اکثره غذايي جيره د منرالونو يا معدني موادو پواسطه عوض کيږي .

۱ . د چرگانو په برخه کي منرالي موادو ته اړتيا شامله ده په کلسيم، فاسفورس، مگنيز، ايودين، سوډيم، کلورين او زنک څخه.

۲ . داسي سپارښتنه کيږي چي هغی ورکونکي چرگانو په خپله جيره کي بايد ۳، ۴ فيصده کلسيم ولري .

A . د هغی ورکونکو چرگانو په برخه کي کلسيم ډير مهم رول لري، دا ځکه چي د هغی شتوالی د هغی د پوستکی د جوړښت لپاره ضروري دی .

H . نور ترکیبات لکه وږي ټکي په غذا کي علاوه کيږي ترڅو له سگدان سره په میده کولو کي مرسته وکړي له دي کبله چي چرگان غلښونه نه لري.

۱ . وږي په وږو اندازو، منځنيو، او لویو اندازو سره تهیه کیدلی شي.

۲ . د هغي کوچنی اندازه چوگورو ته اوغتي اندازي يي هي ورکونکو چکانو ته ورکول کيږي.

B . وږي ټکي خوانو چوگورو ته په اونی کي دوه خلی په غذا باندي په شیندلی شکل سره ورکول کيږي.



۱۱ . د چګانو غذایي جیره د هغې له ګلې او د هغې په نوعي او عمر سره اړیکه لري .

A . د فیل مرغانو تغذیه کول

۱ . Poults (خوان فیل مرغان) له هغی نه د راتو وروسته باید په ډیری تیزی هغوي ته اوبه او خوراکه ورکول شي .

A . که چیري له ۳۶ ساعتونو څخه په زیاتي اندازې سره اوبه او او خوراکه معطل کړل شي په دي صورت کي خوان چورګوري د غذا خوړلو په برخه کي له ستونزو سره مخامخ کیدلی شي.

B. د ځوانو چورگورو لپار مستواتر Starter جيره (د
چورگورو لپاره لومړنۍ جيره) چې د ۲۸ فيصدو پروتين
لرونکي وي د يوي اونۍ لپاره تر استفادي لاندې نيول
کيري .

C. د ۴ نه تر ۶ اونۍ عمر پوري مستواتر Starter جيره (د
چورگورو لومړنۍ جيره) دي ورکول شي چې د ۲۶
فيصدو پروتين او لوړې سطحې انرژۍ لرونکي وي .

D. د ۱۰۰۰ قطعو چورگورو لپاره په هره ورځ کي د اوبو
مصرف د عمر په يوه اونۍ کي ۳۸ ليتره او د ۸ اونۍ په
عمر کي ۳۶۰ ليتره دي.

هغه فيل مرغان چي د نمو په حال كي دي د لسمې اونۍ په عمر
كي كروندې ته وړل كي.

A . كرونده بايد چي هم علوفه او هم دانه باب ولري.

B . هغه فيل مرغان چي د نمو په حال كي دي بايد د جنس په
اساس سره جلا كړل شي دا ځكه چي د هغې نر په زياتي
اندازې سره پروتين ته اړتيا لري.

C . كه چيري فيل مرغانو ته كامله مخلوط شوي غذا وركول
شي په دي صورت كي بنه وزن اخلي.

۱ . نر فيل مرغ د ۸-۱۲ اونى په عمر كي اوبنخينه فيل مرغ د
۸-۱۱ اونى په عمر كي بايد ورته هغه جيره وركول شي چي
د ۲۲ فيصدو پروتين لرونكي وي

۱۱ . د نر فيل مرغ لپاره د ۱۲-۱۶ اونيو په عمر كي اوبنخينه
فيل مرغې لپاره د ۱۱-۱۴ اونى په عمر كي وركونكى جيره
بايد د ۱۹ فيصدو پروتين لرونكي وي.

۱۱۱ . د نر فيل مرغ لپاره د ۱۶-۲۰ اونى په عمر كي او د
بنخينه فيل مرغې لپاره د ۱۴-۱۷ اونى عمر كي بايد
وركونكى جيره د ۱۶،۵ فيصده پروتين لرونكي وي

» ۱۱۱۱ . د نر فيل مرغ لپاره چي د ۲۰-۲۴

اونی عمر ولري اوبن خينه فيل مرغ چي د
۱۷-۲۰ اونی په عمر کي ورکونکي جيره
بايد د ۱۴ فيصدو پروتين لرونکي وي.

» نر فيل مرغ په مجموع کي د ۲۴ اونی په
عمر کي اوبن خينه فيل مرغ په ۲۰ اونی عمر
کي حاصل ته رسيري.

D . د ۱۰۰۰ قطعو فيل مرغانو د هري ورځي د اوبو مصرف
۴۳۵ ليتره اوبه د ۹ اونی په عمر او ۷۵۷ ليتره د ۲۰ اونی
په عمر کي اړيني بلل کيږي.

۳ . د نسل اخستني فيل مرغ بايد د ۱۶ اونۍ په عمر کي
د نسلي گلي لپاره انتخاب کړل شي

A . بنځينه نسلي فيل مرغ د ۱۶-۳۰ اونيو په عمر او
نر فيل د ۱۶-۲۶ اونيو په عمر کي ۱۲ فيصده غذايي
رژيم اخلي .

B . له دي نه وروسته ۱۴ فيصده ورکول کيږي .

C . د نرانو فيل مرغانو لپاره د ۲۶ اونۍ په عمر کي د
نسل اخستني جيره ورکول کيږي چي دا د هغي وزن
کنترولوي په داسي حال مي بنځينه جنس هرڅومره
چي خوړلی يي شي ورکول کيږي .

مرغاوی او قاز په ورته توګه غذا ته اړتیا او ضرورت لري.

A . د دوه لومړنیو اونیو لپاره چې ستا تر جیره کومه چې د ۲۲ فیصدو پروټین لرونکي وي پیل کيږي اوتول شرایط ورته مساعد کيږي ترڅو هغوي یې وخورلی شي.

۱ . قازونو ته دي اجازه ورکول شي چي وروسته له دي چي هغوي دوه اونيو عمر ته ورسيزي د ورځي په جريان کي په څرځای کي وگرځول شي.

A . د قازونو لپاره د هغوي په غذا يا خوراکه کي وړي ټکي کومي چي د حل کيدو قابليت ونه لري علاوه کيزي .

B . هرکله چي د قازونو عمر اوس هم څو ورځي وي نو د علوفي په خوړلو پيل کوي او هرکله چي د هغوي عمر پنځه يا شپږو کالو ته ورسيزي خپل ټول ضروريات له څرځای څخه پوره کولی شي.

۱ . هرکله چي دا کار سرته رسيزي نو د نمو ورکونکی جيري سپارښتنه او توصيه کيزي.

C . که چيري څرځای دښه کیفیت لرونکی نه وي په دي صورت کي بايد چي په تغذيه کي دانه باب علاوه کړل شي.

2. هر کله چي قانونو ته د څړ خای اجازه ورکول شي د هغوي لپاره دانه باب د دوه نه دريو څخه تر ۱۸ اونۍ عمر پوري ترڅو چي حاصل ورکول ته ورسيري، ورکول کيري.

- B . مر غاوی کولی شي چي په کمل احاطه شوی خای او یا هم په نمو کونکو مرغانچو کي وپالل شي.
- ۱ . د مر غاوی لپاره د لامبو او لوبو کولو لپاره اوبه برابری کړی شي ترڅو په هغې کي تمرین وکړي.
- ۲ . سټواتر غذايي رژیم کوم چي د ۲۲ فیصدو پروتین لرونکي وي د دوه اونيو لپاره ورکول کيږي.
- ۳ . سټواتر غذايي رژیم نه وروسته هغوي ته هغه غذايي رژیم پیل کيږي چي ۱۸ فیصده پروتین ولري چي د اخري غذايي رژیم په نامه ياديږي چي ۱۶ فیصده پروتین په هغې کي شامل وي، تغذيه کيږي.

۴ . مرغاوی اکثره د ۷-۸ اونيو په عمر کي مارکیت ته آماده کيږي .

۵ . مرغاوی کولی شي چي له شنو غنګانو څخه استفاده وکړي لیکن نه د قازونو په اندازي سره .

۶ . د مرغاوی لپاره څرخای یا ورشو ضروري نه ده .

C . د دواړو مرغاوو او قازونو لپاره بايد چي تازه اوبه تهيه کړي شي او هغوي هر وخت بايد هغي ته لاسرسی ولري.

۱ . مرغاوو او قاز زياتي اوبه په مصرف رسوي.

۲ . د اوبو خآی د هغي لپاره داسي ډيزاين کيږي چي مرغاوو او قاز په هغي کي لامبو ونه شي کړي. له زده کونکو نه غوښتنه وکړئ چي د قاز او مرغاوو د تغذي په تنظيم کي د اختلافاتو او ورتوالو يو لست واخلي. د هغوي خوا بونه په يوه چارټ يا جدول کي په تخته باندې وليکئ.

هغه سامانونه چي په الوتونكو كي د غذا، اوبو او ارام محيط د
برابرو لو لپاره ورنه استفاده كيږي ډير ضروري دي او د
الوتونكو توليدات زياتوي .

A . پاکی اوبه باید چي د تل لپاره برابري شوي وي.

۱ . د یوي وړيگلي لپاره غوره دي چي اتومات د اوبو لښي په یخه ساحه د پنجرې کي کښ یوډل کيږي.

A . اتومات د اوبو لښي د ټيگلي لپاره ښه کار کوي او د وخت له ضایع کیدلو نه په کوم کي چي چکانو ته اوبه ورکول کيږي، مخنیوی صورت نیسي.

۲ . که چيري غيري اتومات د اوبو لښو نه استفاده صورت نیسي په دي صورت کي د اوبو د لښو شمیر د بیا حل لپاره ډکيږي چي دا کار باید په نظر کي ونیول شي.

۳ . د اوبو د لښو نوعیت همدارگه د چکانو د نوعي او تغذي پوري اړه لري.

A . مرغای او قازونه دي ته میلان لري چي د اوبو په لښو کي لامبو وکړي په دي لحاظ د هغوي لپاره داسي د اوبو لښي تهیه کيږي چي د هغوي د لامبو نه مخنیوی وکړي.

د چرگ پالني معمولي يا عادي د
اوبو لښی



د چرگ پالني اتومات د اوبو لښی

B . د الوتونکو ټولو نوعو لپاره مرغانچي عمومیت لري .

۱ . مرغانچي باید چي په اسانۍ سره پاکي او ضد عفوني کړل شي .

۲ . ټولي مرغانچي باید په کافي انازې سره د هوا جریان تهیه کړي ترڅو له اضافي لمدوالی نه مخنیوی رامنځته شي .

۳ . د وړو چوځو وړو لپاره یوګروپ یا هم لګرمولو نوري الي ضروري دي ترڅو چي د هغوي لپاره تودوخه برابره کړي او هغوي له یخنی نه وساتي .

- C . د کاروبار د پراخوالی د اندازې له نظره د چرک پالنې د اوبو او خوراکی اتوماتیک لونی باید شتون ولري .
- ۱ . دا باید په منظمه توګه پاک وساتل شي .
 - ۲ . د وړوګلو لپاره باید د انتقال وړ د اوبو او خوراکی لونی استعمال کړل شي .























لنڊيز | بياڪتنه

- ۱ . د چڱانو لپاره د غذا يا خوراكي جيره
- ۲ . د فيل مرغانو لپاره د جيرو تنظيمول
- ۳ . د مرغاوۍ او قازونو لپاره د جيرو تنظيمول
- ۴ . هغه سامانونه چي د چرگ پالني د تنظيم په خاطر ورڅخه استفاده صورت نيسي.