

(*Cydia*, *Grapholita* or *Laspeyresia molesta*)



UC Statewide IPM Project  
© 2000 Regents, University of California

د تلی په منځ کی چینجی



د شفتالو د خانگو په  
څوکو کی ډیره معمولی  
حمله



ځوان پتنگ

هغه نقص چی د بادامو میوی ته  
رسیدی دی



UC Statewide IPM Project  
© 2000 Regents, University of California

**توضیحات :-** دا حشره ډیره مهم آفت دي شفتالو او یو څه دي منو، بادامو، ناکو، زردالو، آلو او بهي لپاره ده .

د حمل په لمړیو کی لمړی چنجی له استراحت څخه خوځیری ځوانی بنځینه پتنگانی د شپي له خوا لوزي او په پانو کی هله هگی اجوي چه دي تودوخی درجه CO ۱۵ نه جگه وي چنجیان په مراویو تنو کی ننوزي لکه تخم خورونکی چنجی دا هم په میوه کی ننوزي او مغز ئی خوري کله کله بوز غلیو هم یرغل کوي . چنجی په پانو باندي او یا دي خاوري په سر په پیله کی بتیوی ژوند کوي دا حشرات تر څلورو نسلونو په یوه کال کی کوي دا حشره د ژمی یخ دي بتیوی په شکل په پیله کی تیروي .

**تفتیش او نظارت :-** باید چه باغونه ولیدل شي چه دي آفت ئی میوي وهلي دي که نه او باید چه نوټ شي .

2 \_ په شفتالو او بادامو کی د تنو مراوي زونبو کی باید حساب شي د حمل په نماني کی په تنو باندي حملو علائم ولیدل شي دا حملی په ځوانو ونو او بچگیو کی په آسانی سره معلومیدای شي . داتنی دوکی په جاقو باندي پر بکړي. دي ختیزی میوي پتنگ چنجی سپین او یا گلابی او تور نصواری وي . خو د د شفتالو د تن چنجی تیاره قهوئی وي او دي هر Segment تر مینځ سپنی پتی لري او تور دي . که په یوه ونه کی څلور او یا زیاتي حملی ولیدلی شي نو دوا پاشی ته ضرورت شته .

3- دي فیرمون تلک دي دوا پاشی دي وخت لپاره استعمالیدای شي دا تلکونه په دلوه کی په باغ کی کیږدي او هفته وار ئی نظارت وکړي اووه ورځی وروسته کله چه لمړی نارینه حشره دي دوهم نسل مینځ ته راشی دوا پاشی دي وشي چه معمولاً په ثور کی وي .

## مخ نیوي

که ضرورت وي سپاینوساید یا کلوروپاپره فوش سهار دي وخته او یا دي شپي ناوخته تطبیق کړي تر څو چه له مچپو نه مخنیوي شوي وي . که تاسو د تخم خورونکی چنجی لپاره دوا پاشی وکړي دا هم د ختیز د میوو چنجی ته گټه رسوي .